

ANNUELLE

MULTIPLICATION

BÉGONIA I'CONIA® PORTOFINO

Begonia x hybrida



PLATEAUX ET ENRACINEMENT

Forme	Bouture végétale (BNR)
Hormone d'enracinement?	Non
Format de plateau	102, en bandes séparables
Plants par alvéoles	1
Jours sous brumisation	14-21
Sem. entre le piquage et la transplantation	4-5
Pincement durant la multiplication?	Oui
Semaines avant pincement	3 *doit être pincée tôt, avant de compter 5 nœuds

FERTILISATION

Fertilisation avec la brumisation?	Aucune
Taux de fertilization	50-100ppm N
Valeur de la CE	Faible: (0,8-2,0 mS via SME)
Valeur du pH	5,6-6,2

TEMPÉRATURE

Temp. moyenne du sol	21-24°C (70-75°F)
Temp. ambiante moyenne (jour)	24-27°C (75-80°F)
Temp. ambiante moyenne (nuit)	20-22°C (68-72°F)

ARROSAGE

Fréquence des arrosages	Niveau 2: permettre au médium de sécher modérément entre les arrosages
-------------------------	---

ÉCLAIRAGE

De jours neutres?	Non
Eclairage supplémentaire	14 heures par jour
Bénéficie de l'ombre?	Oui

MALADIES À SURVEILLER

Botrytis, Xanthomonas, oïdium

INSECTES À SURVEILLER

Aleurodes, acariens, thrips

SUGGESTIONS DE RCP

- 500ppm Cycocel/Citadel (11,8% Chlormequat).



T'Conia Portofino Sunrise'

CONSEILS

- Déballez et trie les boutures dans une chambre froide à 12 °C (54 °F). Entreposez-les dans la chambre froide pour la nuit si elles ne sont pas piquées immédiatement.
- Au moment du repiquage des boutures, veillez à ne pas recouvrir le point de croissance apicale en plaçant les larges feuilles dans le même sens.
- Brumisez les boutures juste assez pour les garder turgescents. La brumisation peut être requise jour et nuit durant les 10-14 premiers jours. Quand les boutures commencent à former des racines, la brumisation doit être réduite et on l'arrête complètement autour du 20e jour.
- Entre le 21 septembre et le 21 mars, les boutures doivent profiter d'une longue photopériode durant la multiplication pour prévenir une floraison prématurée. Un éclairage pour chrysanthèmes entre 22 h et 2 h ou un éclairage d'appoint avec lampe à DHI du coucher du soleil à 2 h peut servir à créer des jours longs.

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER À GRANDIR

Tech.NA@DummenOrange.com

614-850-9551

[DummenOrange.com](https://www.DummenOrange.com)

ANNUELLE
FINITION

BÉGONIA I'CONIA® PORTOFINO

Begonia x hybrida



FORMAT DE CONTENANT	PLANTS PAR POT	TRANSPLANT AU PLANT FINI (SEM)
10 cm (4 po)	1	6-9
15 cm (6 po)	2-3	9-12
22 cm (10 po) et plus	4-5	10-14

FERTILISATION

Taux de fertilization	100-150 ppm N
Valeur de la CE	Modérée: (2,0-3,5 mS via SME)
Valeur du pH	5,6-6,2

TEMPÉRATURE

Temp. ambiante moyenne (jour)	18-23°C (65-73°F)
Temp. ambiante moyenne (nuit)	20-24°C (68-75°F)

ARROSAGE

Fréquence des arrosages	Niveau 3 : garder le médium modérément humide avec des périodes légèrement sèches
-------------------------	--

ÉCLAIRAGE

De jours neutres?	Non
Luminosité optimale	32300-75300 lux (3000-7000 pc)
Éclairage supplémentaire	Interruption nocturne
Bénéficie de l'ombre?	Oui

PINCEMENT

Pincement de finition?	Optionnel
De la transplantation au pincement (jours)	Les plants non pincés durant la multiplication sont pincés à 3 nœuds à la transplantation

MALADIES À SURVEILLER

Botrytis, Xanthomonas, oïdium

INSECTES À SURVEILLER

Aleurodes, acariens, thrips

SUGGESTIONS DE RCP

- 500 ppm Cycocel/Citadel (11,8 % Chlormequat)
- Faibles doses de B-Nine (85% Daminozide) à 1000-1500 ppm ou de Cycocel/Citadel (11,8 % Chlormequat) à 250-350 ppm, ou une application ponctuelle par vaporisation pour contrôler la croissance au besoin.



CONSEILS

- Les bégonias I'Conia se finissent mieux sous une lumière modérée de 32000-54000 lux (3000-5000 pc). Évitez de déplacer les plants d'une lumière modérée à une lumière intense ou à une température élevée sans acclimatation préalable. Cela pourrait provoquer la brûlure du feuillage.
- Plusieurs facteurs environnementaux ou de production peuvent être utilisés pour induire la floraison quand les plants ont atteint 2/3 de la taille finie désirée: une toile noire pendant 14 jours, un stress hydrique (à plusieurs reprises, laisser les plants se faner légèrement avant de les arroser), une basse fertilité (fertilisation reportée).

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER À GRANDIR

Tech.NA@DummenOrange.com

614-850-9551

[DummenOrange.com](https://www.DummenOrange.com)

ANNUELLE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

BÉGONIA I'CONIA® PORTOFINO

Begonia x hybrida



INFORMATIONS DE BASE

Non commun principal	Bégonia
Instructions d'arrosage pour le consommateur	Garder le sol uniformément humide, mais jamais détrempé.
Période de floraison	Du printemps à l'automne
Exposition	Plein soleil à ombre dense
Hauteur	30-41 cm (12-16 po)
Espacement au jardin	30-41 cm (12-16 po)

DESCRIPTION

Les résultats de l'hybridation des bégonias la plus avancée sont réunis dans la série I'Conia Portofino. Avec une floribondité exubérante, peu ou pas de chute de pétales et d'énormes fleurs élégantes, ces cultivars représentent l'avenir des bégonias.

ATTRAIT POUR LE CONSOMMATEUR

- Des coloris merveilleux qui brillent contre le feuillage foncé de bégonia.
- La marque I'Conia met l'accent sur le concept de « l'élégance instantanée ».

QUALITÉS AU JARDIN

- Idéal pour les contenants sur le patio et les jardinières suspendues haut de gamme.
- Préfère un sol humide et bien drainé.
- Des fleurs magnifiquement colorées produites sans arrêt tout l'été, qui sont parfaites pour les endroits achalandés.

ORIGINES

Issus de l'hybridation : les lignées des parents utilisés proviennent d'Amérique du Sud, d'Amérique Centrale, d'Asie et d'Afrique.



T'Conia Portofino Champagne'



La marque I'Conia bénéficie d'une gamme complète de produits pour les points de vente.

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER À GRANDIR

Tech.NA@DummenOrange.com

614-850-9551

[DummenOrange.com](https://www.DummenOrange.com)